



Hemocultivos: uso e indicaciones

>>> La optimización de recursos busca establecer acciones que conduzcan a diagnósticos certeros. En este artículo se propone la aplicación de predictores para el empleo de hemocultivos garantizando el uso racional de insumos médicos reduciendo los costos sanitarios y mejorando la salud de los pacientes

>>> AUTORES

Felipe Andrés Solano Rojas¹, María Fernanda Valverde Solano¹, Kevin Josué Oviedo Pérez¹, Alberto Quesada Pacheco⁴, Carolina Gutiérrez Méndez²

1 Caja Costarricense de Seguro Social, San José Costa Rica.

2 Bachiller en Ciencias Médicas Trabajador independiente, San José Costa Rica

>>> CORRESPONDENCIA

felipeasolano@gmail.com


Fuente: *Revista Ciencia y Salud Integrando Conocimientos*, 5(6),

Pág.43-49. <https://doi.org/10.34192/cienciaysalud.v5i6.36>

>>> RESUMEN

La bacteriemia se ha asociado a una mortalidad considerable en el paciente hospitalizado, por lo que se han desarrollado reglas de decisión clínica para calcular la probabilidad pre-test de tener una bacteriemia; estas no se usan con frecuencia en la práctica clínica, ni en datos clínicos aislados como la fiebre, leucocitosis, taquicardia o aumento de marcadores inflamatorios, que no son útiles. Los hemocultivos son un arma de doble filo en el abordaje del paciente séptico, si bien su utilidad en estos pacientes está establecida, su uso irracional genera un uso inadecuado de antibióticos, un aumento en la media de estancia hospitalaria y los costos hospitalarios. La decisión para realizar la toma de hemocultivos debe ser individualizada en cada paciente, tomando en cuenta predictores de bacteriemia y calculando la

MÁS DE 40 AÑOS DE TRAYECTORIA
EXCELENCIA DIAGNÓSTICA AL SERVICIO DE LA SALUD



Un laboratorio de vanguardia internacional en la Argentina.

Tecnología y profesionales con los más altos valores humanos abocados a ofrecer la máxima precisión y calidad diagnóstica para el bienestar de nuestros pacientes.

Labmedicina
ANÁLISIS CLÍNICOS

Acreditado: NORMA - ISO 15189*

Alcances de acreditacion en: www.oaa.org.ar

 (+011) 154 092 2001  (+011) 5263 9911  info@labmedicina.com labmedicina.com

probabilidad pre-test de obtener un verdadero positivo, especialmente en pacientes que ya han iniciado un esquema de antibióticos o en quienes ya se ha documentado un agente microbiológico.

Palabras Clave: hemocultivos, bacteriemia, shock séptico, antibióticos, fiebre.

>>> INTRODUCCIÓN

Se estima que hay más de 200 000 episodios de bacteriemia al año¹, y cada episodio documentado se asocia a una mortalidad de 14 – 37% en salón general^{1,2}. Actualmente, la habilidad para predecir estos episodios de bacteriemia es baja, de todos los hemocultivos tomados en pacientes hospitalizados, solamente el 5 a 10% son positivos; y de estos, 30 a 50% son contaminantes^{2,3}. El estudio *Diagnostic Stewardship Intervention To Improve Blood Culture Use among Adult Nonneutropenic Inpatients (DISTRIBUTE)*³ demostró que el uso liberal de hemocultivos aumenta el riesgo de obtener falsos positivos, lo cual extiende los días de estancia hospitalaria, el uso de antibióticos, el número de exámenes innecesarios y los costos hospitalarios. Además, cuando se obtienen verdaderos positivos, algunos médicos se muestran resistentes a cambiar el esquema de antibioticoterapia a uno con menor amplitud⁴.

Algunos estudios indican que una gran cantidad de hemocultivos se realiza de forma innecesaria, aumentando los costos y el riesgo de hemocultivos contaminados^{5,6}, por ejemplo: se estima que el 30% de todos los hemocultivos realizados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) médicos y más del 40% de los hemocultivos realizados en servicios de medicina son inapropiados, usualmente indicados por procesos no infecciosos, fiebre persistente, cultivos de seguimientos o en pacientes con bajo riesgo de bacteriemia³.

En UCI, la sospecha clínica de sepsis se tiene en alrededor de un 9% de los pacientes, con una mortalidad de hasta 60%, sin embargo, se documenta un agente microbiológico solamente en un 71% de los casos, siendo las bacteriemias alrededor de 53% (7). Muchos pacientes ya han recibido antibioticoterapia de manera empírica previo a su ingreso a la UCI, disminuyendo el rendi-

miento de los cultivos^{1,7}, de los cuales: un 50% de los positivos es por contaminantes, aumentando en un 39% el uso de antibióticos^{2,3,7}.

La eficiencia de los hemocultivos en pacientes hospitalizados suele ser bastante baja, y los cultivos tomados “de rutina” suelen tener poco valor clínico⁸.

>>> MÉTODOS

Para la elaboración de este artículo se realizó una búsqueda en la base de datos de PubMed con las palabras: *blood cultures, sepsis, antibiotics, guidelines, hemocultivos, contaminantes, febril*. Se seleccionaron artículos en inglés y en español relevantes al tema central de investigación, debido a la falta de bibliografía afín al tema principal, se incluyeron estudios publicados máximo hasta el año 2000.

El paciente febril

La fiebre aislada no es un predictor adecuado de bacteriemia^{3,4}, es frecuente la toma de hemocultivos de manera refleja ante la fiebre, lo cual aumenta el riesgo de contaminantes y aumenta los costos^{3,8}, además, la bacteriemia suele iniciar 1-2 horas antes del pico febril, lo cual es difícil de predecir en el momento, por lo que el tiempo en que se toman los hemocultivos no es tan importante⁹.

Se pensaba que el fenómeno de la fiebre precedida por una bacteriemia se debía a bacteriemias intermitentes, sin embargo, esto no tiene adecuada evidencia y no debería ser un justificante para realizar múltiples hemocultivos¹⁰. Existe ahora el concepto de bacteriemias continuas con una densidad muy baja de microorganismos^{7,9,10}, tomando en cuenta esto, y además como se ha documentado en múltiples estudios^{8,9,10,11} el determinante más importante en la eficiencia de un hemocultivo es la cantidad de sangre enviada a cultivar y no el momento en el cual se toma el hemocultivo. Enviar 30 – 40 mL de sangre aumenta el rendimiento entre 4,2 a 19%^{10,11}.

Realizar hemocultivos de control por fiebre aislada indiferenciada no tiene valor clínico,

salvo en casos de endocarditis infecciosa o bacteriemia documentada por *S. aureus*^{1,3}.

El paciente persistentemente febril

En pacientes hospitalizados infectados, es frecuente tener fiebre persistente, aun cuando se ha iniciado antibioticoterapia de manera empírica, Grace et. al.¹ en su estudio retrospectivo para determinar la eficiencia de los cultivos tomados 72 horas posterior a inicio de antibióticos, demostraron que ni la edad, sexo, temperatura, conteo de leucocitos o comorbilidades, eran predictores de aislamiento microbiano en estos pacientes. En su análisis, solamente la presencia de endocarditis o el aislamiento de *Staphylococcus aureus* (*S. aureus*) en cultivos pre antibiótico, predijeron el aislamiento en cultivos subsecuentes posterior a inicio de antibióticos. Los autores de este estudio sugieren que una vez que se ha identificado un microorganismo, realizar cultivos de seguimiento no es

necesario, excepto en pacientes con bacteriemia por *S. aureus*. El estudio *DISTRIBUTE*³ extiende esta recomendación también para pacientes con sospecha de endocarditis y además a pacientes con riesgo de infección asociada a un catéter intravascular, lo cual ha demostrado ser un predictor de bacteriemia también en otros estudios^{5,7,12}.

En el caso de la fiebre persistente y la toma de hemocultivos seriados, Shafazand et. al.⁷ estimaron que, en casos de bacteriemia, la probabilidad de tener un segundo set de hemocultivos positivos es de 85%, ascendiendo a más de 95% en casos de endocarditis, si el primer set ha dado positivo. Esto concuerda con estudios previos de Gross, et. al.¹ quienes recomiendan no realizar hemocultivos de seguimiento en casos de fiebre persistente cuando no se logra documentar un agente microbiológico en el primer set de cultivo.



μGASES

Analizador de pH y Gases en Sangre

pH pCO₂ pO₂

BAJO CONSUMO DE REACTIVOS


INGRESO DE MUESTRA POR
ASPIRACIÓN DE TUBO O JERINGA,
INYECCIÓN Y MICROMÉTODO.

ELECTRODOS Y REACTIVOS
INDIVIDUALES

FÁCIL MANTENIMIENTO

DATOS DE ALMACENAMIENTO
ILIMITADOS

DISPLAY INTERACTIVO DE 10 "



SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO



www.aadee.ar info@aadee.com.ar [company/aadee-s.a.](https://www.linkedin.com/company/aadee-s.a.)

Av. Triunvirato 4135 5º piso - C1431FBD - Buenos Aires - Argentina (54-11) 4523-4848 (Rot.) (54-11) 4523-2291



Hemocultivos seriados

En el manejo de bacteriemias, los hemocultivos seriados positivos se asocian a un aumento en la mortalidad⁵, por lo cual se podría intuir que realizar hemocultivos de control en pacientes con bacteriemia ya documentada podría tener un valor clínico, sin embargo, Wiggers, et. al.⁵ en su estudio retrospectivo de cohorte, evaluaron 2715 pacientes con hemocultivos positivos, de los cuales 914 (33,7%) fueron contaminantes y solamente 118 pacientes se documentaron con bacteriemia persistente (6,6%), los autores mencionan que solamente tres pacientes en el grupo de bacteriemia persistente tuvieron un cambio en su esquema de antibióticos. En este estudio los predictores independientes de bacteriemia persistente fueron: sexo masculino (OR (odds ratio) 2.59, IC 95% 1.28 – 5.25), admisión a un servicio de medicina (OR 2.80, IC 1.34 – 5.84), bacteriemia por *S. aureus* (OR 4.99; IC 95% 1.88 – 10.73), foco de infección endovascular (OR 7.66; IC 95% 2.30 – 25.48) o epidural (OR 26.99; IC 1.91 – 391.08).

Canzoneri, et. al.⁶ en su estudio sobre la necesidad de realizar hemocultivos de control en pacientes con bacteriemia por bacilos gram negativos, analizaron 500 episodios de bacteriemia y documentaron que al contrario de estudios anteriores: al realizar cultivos de seguimiento, la fiebre en el día en que se tomó el hemocultivo de control era un factor predictivo independiente de bacteriemia persistente, sin embargo en su estudio no hubo ninguna asociación entre los hemocultivos positivos de control y un aumento en la mortalidad o en el número de admisiones a unidades de cuidados intensivos. Los autores concuerdan con que realizar hemocultivos de manera liberal aumenta el riesgo de contaminación, los costos hospitalarios, la estancia hospitalaria y el uso inapropiado de antibióticos.

En pacientes hospitalizados infectados, con un germen ya identificado, la presencia de fiebre persistente no aumenta la mortalidad^{5,6}, y se estima que solamente un 0.72% de todas las bacteriemias captadas en hemocultivos seriados en estos pacientes, se debe a un agente microbiano distinto al identificado inicialmente⁵, tomando en cuenta que los hemocultivos seriados aumentan el

riesgo de falsos positivos, no se puede recomendar esta práctica en todos los casos de bacteriemia; se recomienda únicamente en casos específicos donde hay una muy alta probabilidad de bacteriemia persistente y donde su documentación puede tener un impacto en la terapéutica (endocarditis infecciosa, infección endovascular, bacteriemia por *S. aureus*, candidemia)^{1,3,5,8,12}.

Predictores de bacteriemia

Si bien los estudios son heterogéneos en cuanto a las variables que determinan la probabilidad de encontrar una bacteriemia real, algunos concuerdan^{2,3,5,6} en que entre los predictores de bacteriemia se encuentra la sospecha de: endocarditis infecciosa, infecciones endovasculares, infecciones asociadas a catéteres, además de datos sugestivos de daño orgánico (e.j PAS < 90 mmHg, lesión renal aguda, coagulación intravascular diseminada, hiperlactatemia)^{4,12} y la incapacidad para realizar un adecuado control de la fuente infecciosa⁵.

En el estudio de Coburn, et. al.¹² se realizó una revisión de 35 estudios para determinar la prevalencia y probabilidad de encontrar una bacteriemia, ellos documentaron que una temperatura por encima de 38°C tenía un OR de 1.9 (IC 95%, 1.4-2.4) de tener una bacteriemia, sin embargo la evaluación de los estudios fue muy heterogénea, estos autores mencionan que los escalofríos en pacientes febriles parecen tener una mayor utilidad para identificar episodios de bacteriemia, con un OR de 2.2 (IC 95%, 1.4-3.3), de igual forma en su estudio la presencia de hipotensión, definida como una presión arterial sistólica (PAS) menor a 90 mmHg o la necesidad de utilizar vasopresores, así como un conteo de plaquetas menor de 150 000/uL, linfopenia menor de 500/uL o un índice de neutrófilos-linfocitos mayor a 10, aumentaban la probabilidad de bacteriemia. Estos datos clínicos son sugestivos de sepsis severa y daño orgánico¹³), lo cual nos debe llevar a considerar el contexto del paciente y no debería sugerir la necesidad de hemocultivos basados únicamente en estos datos de manera aislada.

Con respecto al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), el cual se ha

Na⁺K⁺Cl⁻Ca⁺⁺Li⁺

pH

Diestro

LLEVANDO TECNOLOGÍA DESDE ARGENTINA AL MUNDO

AMÉRICA

| EUROPA

| ÁFRICA

| ASIA

- Fácil de operar
- Libre de mantenimiento
- Bajo costo por determinación
- Se adapta a las necesidades de su laboratorio



LA ELECCIÓN DE HOY QUE LO ACOMPAÑARÁ EN EL FUTURO

Comuníquese con nosotros:

+54 11 4709 7707

| info@diestroweb.com

| www.diestroweb.com



documentado como un predictor de bacteriemia¹², se debe recordar que, en pacientes quirúrgicos particularmente, el trauma tisular y el estrés fisiológico post operatorio pueden generar leucocitosis, fiebre y datos de SIRS⁵. Coburn, et. al.¹² mencionan que la probabilidad de bacteriemia para pacientes con meningitis, shock séptico y sepsis severa es de 38-69%, además de otros signos ya mencionados los cuales son indicadores de disfunción orgánica, esto podría implicar que la severidad del cuadro clínico podría ser un mejor predictor de bacteriemias y de hemocultivos con un verdadero positivo, se desconoce si se ha realizado un estudio que compruebe esta hipótesis.

Algunos autores recomiendan valorar la probabilidad pre-test para obtener un hemocultivo positivo antes de indicarlo^{4,7,12}; Shapiro, et. al.⁴ en su estudio de cohorte prospectivo desarrollaron y validaron una regla de decisión (tabla 1) para determinar la probabilidad de que un paciente en el servicio de emergencias o con al menos tres horas admitido en hospitalización, tenga una bacteriemia. Esta regla agrupa a los pacientes en categorías de riesgo bajo (0-1 puntos), moderado (2-5 puntos) y alto (> 6 puntos), acorde con la cantidad de criterios que cumplan, en cada categoría el riesgo de una bacteriemia es de 0.6%, 6.8% y 25.6% respectivamente. Presenta una sensibilidad de 98.0% y especificidad de 29.0%, con un valor predictivo positivo y negativo de 11.1% y 99.4% respectivamente, lo cual le confiere un poder adecuado para tomar decisiones, cuando estos criterios se encuentran ausentes es muy poco probable que el paciente tenga una bacteriemia y por tanto la toma de hemocultivos no está indicada. Los autores mencionan que utilizando esta herramienta se puede reducir hasta en un 27% la toma de hemocultivos, sin embargo, a nuestro conocimiento, esta regla no es utilizada con frecuencia.

>> Tabla I

Tabla 1*	
Criterios mayores	Criterios menores (1 punto cada uno)
Sospecha de endocarditis (3 puntos)	Temperatura 38.3°C – 39.3°C
Temperatura > 39.4°C (3 puntos)	Edad > 65 años
Presencia de catéter intravascular (2 puntos)	Escalofríos
	Vómitos
	Hipotensión (PAS < 90mmHg)
	Conteo de leucocitos > 18,000 células/mm3
	Bandas > 5%
	Plaquetas < 150,000 células/mm3
	Creatinina > 2 mg/dL
La presencia de 1 criterio mayor o de 2 criterios menores es indicación para tomar un hemocultivo.	
*Adaptado de Shapiro et al (4)	

Existen marcadores como la procalcitonina que se han descrito como una herramienta para determinar la probabilidad de que un paciente se encuentre infectado, sin embargo, su valor es mayor para descartar la presencia de una bacteriemia que para probar la misma¹⁴. En este sentido, Van Ser Geest, et. al.¹⁵ buscaron determinar el valor de la procalcitonina para la decisión de tomar hemocultivos en pacientes críticos; documentaron que un valor de corte de procalcitonina de <0.25 ng/mL tiene un valor predictivo negativo y positivo de 96% y 29% respectivamente, con una sensibilidad de 98% y una especificidad de 20%; mencionan que de utilizarse la procalcitonina como un predictor pre-test se pudo haber reducido en un 17% la toma de hemocultivos. Esto concuerda con el estudio de Savitri, et. al.¹⁵. La procalcitonina se puede utilizar como un marcador para descartar la posibilidad de bacteriemia, sin embargo, se considera que la toma de decisiones debe realizarse valorando todo el cuadro clínico y no con un valor aislado de laboratorio.

Hemocultivos en el paciente con antibióticos

El uso de antibióticos de manera temprana en el paciente séptico es una de las medidas con reducción de mortalidad más importantes en el manejo de estos pacientes^{12,13,16,17}. En pacientes hospitalizados se puede encontrar ante la decisión de tomar un hemocultivo en pacientes que ya han iniciado esquema de antibióticos o que ya tienen un aislamiento microbiológico, al respecto: en un estudio retrospectivo donde evaluaron la toma de hemocultivos antes del inicio de antibióticos y tras 72 horas de iniciarlos, en 149 pacientes febriles¹⁷, determinaron que de los 56 cultivos positivos iniciales que obtuvieron, solamente 26 continuaban persistentemente positivos posterior a 72 horas de antibioticoterapia, y de estos solamente en un paciente se aisló un microorganismo distinto. Esto concuerda con el racional de no realizar cultivos seriados de control como fue comentado anteriormente.

El 30% de todos los hemocultivos que se realizan se indican de manera innecesaria y sobre todo en pacientes en quienes ya se han iniciado antibióticos³, tomando en cuenta que el 91.5% de los episodios de bacteriemias que son detectadas se documentan con el primer set de hemocultivos⁷ y que el uso liberal de antibióticos, sobre todo en pacientes que no lo requieren, puede generar:

toxicidad asociada a los antimicrobianos, toxicidad mitocondrial, reacciones adversas a medicamentos, selección selectiva de organismos resistentes y disrupción del microbioma del paciente¹⁸, se debe realizar una valoración minuciosa e individualizada a la hora de considerar la toma de hemocultivos en estos pacientes, sobre todo en casos en que ya se ha documentado un agente microbiológico.

>>> CONCLUSIONES

El uso liberal de hemocultivos aumenta el riesgo de obtener falsos positivos, lo cual aumenta los días de estancia hospitalaria, el número de exámenes innecesarios y el uso inadecuado de antibióticos.

La fiebre aislada no corresponde a un predictor fiable de bacteriemia y no se debe recomendar el uso de hemocultivos únicamente por un episodio febril. Es frecuente documentar fiebre persistente durante las primeras 72 horas de inicio de antibioticoterapia, sin embargo, solamente está recomendado la toma de hemocultivos seriados en pacientes con endocarditis infecciosa, candidemia o bacteriemia por *S. aureus*.

Pocos modelos de predicción de bacteriemia han sido validados, y estos no suelen ser utilizados en la práctica clínica, sin embargo, el

DIAGNOS MED S.R.L. 

EUROIMMUN
a PerkinElmer company 


Kit Euroimmun para Síndromes Neurológicos Paraneoplásicos (SNP)

Presentación 16 tiras recubiertas con antígenos Clase IgG
Producto registrado ante ANMAT

Ralizamos pedidos mensuales.

Para mayor información comunicarse al:
info@diagnosmed.com - promocion2@diagnosmed.com
O bien al (011)4552-2929 Líneas rotativas

www.diagnosmed.com



criterio clínico es un mal predictor de bacteriemia, particularmente cuando se realizan hemocultivos de manera refleja ante un episodio febril.

Las reglas de decisión clínica que se han desarrollado parecen ser útiles para valorar la probabilidad pre-test de una bacteriemia, al igual que marcadores como la procalcitonina o datos clínicos de SIRS, tienen una sensibilidad para determinar, en su ausencia, cuál paciente tiene una probabilidad muy baja de tener una bacteriemia.

Signos clínicos aislados como fiebre, leucocitosis, taquicardia no son adecuados predictores de bacteriemia y se debe valorar cada paciente de manera individual para definir la probabilidad pre-test de obtener un verdadero positivo al realizar un hemocultivo.

>>> REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Grace C, Lieberman J, Pierce K, Littenberg B. Usefulness of Blood Culture for Hospitalized Patients Who Are Receiving Antibiotic Therapy. *Clin Infect Dis*. 2001; 32(11):1651-1655.
- Eliakim-Raz N, Bates D, Leibovici L. Predicting bacteraemia in validated models – a systematic review. *Clin Microbiol Infect*. 2015; 21(4):295-301.
- Fabre V, Klein E, Salinas A, Jones G, et al. A Diagnostic Stewardship Intervention to Improve Blood Culture Use among Adult Nonneutropenic Inpatients: DISTRIBUTE Study. *J Clin Microbiol* [Internet]. 2020 [Consultado 29 Jul 2021]; 58(10): e01053-20. Disponible en: <http://www.jcm.asm.org>.
- Shapiro N, Wolfe R, Wright W, Moore R, Bates D. Who Needs a Blood Culture? A Prospectively Derived and Validated Prediction Rule. *J Emerg Med*. 2008; 35(3):255-264.
- Wiggers J, Xiong Wei, Daneman N. Sending repeat cultures: is there a role in the management of bacteremic episodes? (SCRIBE study). *BMC Infect Dis* [Internet]. 2016 [Consultado 29 Jul 2021]; 16:286. Disponible en: <https://bmcinfectdis.biomedcentral.com>.
- Canzoneri C, Akhavan B, Alcedo P, Aisenberg G. Follow-up Blood Cultures in Gram-Negative Bacteremia: Are They Needed? *Clin Infect Dis*. 2017; 65(11):1776-1779.
- Shafazand S, Weinacker A. Blood Cultures in the Critical Care Unit: Improving Utilization and Yield. *Chest*. 2002; 122(5):1727-1736.
- Kirin T, Weinstein M. Update on blood cultures: how to obtain, process, report, and interpret. *Clin Microbiol Infect*. 2013; 19(6):513-520.
- Leyssene D, Gardes S, Vilquin P, Flandrois J, Carret G, Lamy B. Species-driven interpretation guidelines in case of a single-sampling strategy for blood culture. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2011; 30(12):1537-1541.
- Dargere S, Parienti J, Roupie E, Gancel P, et al. Unique blood culture for diagnosis of bloodstream infections in emergency departments: a prospective multicentre study. *Clin Microbiol Infect*. 2014; 20(11):O920-O927.
- Lamy B, Dargere S, Arendrup M, Parienti J, Tattevin P. How to Optimize the Use of Blood Cultures for the Diagnosis of Bloodstream Infections? A State-of-the Art. *Front Microbiol* [Internet]. 2016 [Consultado el 29 Jul 2021]; 7:697. Disponible en: <https://frontiersin.org>.
- oburn B, Morris A, Tomlinson G, Detsky A. Does This Adult Patient with Suspected Bacteremia Require Blood Cultures? *JAMA*. 2012; 308(5):502-511.
- Gyawali B, Ramakrishna K, Dharmoon A. Sepsis: The evolution in definition, pathophysiology, and management. *SAGE Open Med* [Internet]. 2019 [Consultado el 29 Jul 2021]; 7: 2050312119835043. Disponible en: <https://journals.sagepub.com>.
- Kibe S, Adams K, Barlow G. Diagnostic and prognostic biomarkers of sepsis in critical care. *J Antimicrob Chemother*. 2011; 66(2):ii33-ii40.
- Van der Geest P, Mohseni M, Nieboer D, Duran S, Groeneveld A. Procalcitonin to guide taking blood cultures in the intensive care unit; a cluster-randomized controlled trial. *Clin Microbiol Infect*. 2017; 23(2):86-91.
- Strich J, Heil E, Masur H. Considerations for Empiric Antimicrobial Therapy in Sepsis and Septic Shock in an Era of Antimicrobial Resistance. *J Infect Dis*. 2020; 222(2): S119-S131.
- Weinberger J, Rhee C, Klompas M. A Critical Analysis of the Literature on Time-to-Antibiotics in Suspected Sepsis. *J Infect Dis*. 2020; 222(2):S110-S118.
- Arulkumaran N, Routledge M, Schlebush S, Lipman J, Conway A. Antimicrobial-associated harm in critical care: a narrative review. *Intensive Care Med*. 2020; 46(2):225-235



Analizador Multiparamétrico

Totalmente Automatizado

- Dispositivo individual de un solo uso que contiene todos los reactivos necesarios para realizar el ensayo.
- Capacidad multiparamétrica: Procesa hasta 30 diferentes pruebas por corrida.
- La velocidad permite obtener resultados simultáneos de diferentes paneles.
- El primer resultado se obtiene antes de 90 minutos.
- Volumen de muestra:
La muestra se dispensa manualmente. ELISA:
Mínimo de muestra 60 uL.
Fijación de complemento:
Mínimo de muestra 120 uL.



Enfermedades Infecciosas

ADENOVIRUS IgA
ADENOVIRUS IgG
BORDETELLA PERTUSSIS IgA
BORRELIA IgG
BORRELIA IgM
CHIKUNGUNYA IgG
CHIKUNGUNYA IgM
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgA
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgG
CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgM
CLOSTRIDIUM DIFFICILE A/B TOXINS
CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH
CYTOMEGALOVIRUS IgG
CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY
CYTOMEGALOVIRUS IgM
DENGUE IgG
DENGUE IgM
DIPHTERIA IgG
ECHINOCOCCUS IgG
EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgG
EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgM
EPSTEIN-BARR EBNA IgG
EPSTEIN-BARR VCA IgG
EPSTEIN-BARR VCA IgM II
HELICOBACTER PYLORI IgA

HELICOBACTER PYLORI IgG
HSV1 SCREEN
HSV2 SCREEN
HERPES SIMPLEX 1 IgG Recombinant
HERPES SIMPLEX 1+2 IgM
HERPES SIMPLEX 2 IgG Recombinant
INFLUENZA A IgA
INFLUENZA A IgG
INFLUENZA B IgA
INFLUENZA B IgG
LEGIONELLA PNEUMOPHILA
LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1 IgG
LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1-6 IgG
LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM
LEGIONELLA URINARY ANTIGEN
MEASLES IgG
MEASLES IgM
MUMPS IgG
MUMPS IgM
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG
MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM
Parvovirus B19 IgG
Parvovirus B19 IgM
POLIOVIRUS IgG

RESPIRATORY SYNCYTIAL IgA
RESPIRATORY SYNCYTIAL IgG
RUBELLA IgG AVIDITY
RUBELLA IgG
RUBELLA IgM
SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT
TETANUS IgG
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS
TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM
TIROGLOBULIN HIGH SENSITIVITY
TOSCANA VIRUS IgG
TOSCANA VIRUS IgM
TOXOCARA IgG
TOXOPLASMA IgA
TOXOPLASMA IgG AVIDITY
TOXOPLASMA IgG
TOXOPLASMA IgM
TRACHOMATIS IgA
TRACHOMATIS IgG
TREPONEMA IgG
TREPONEMA IgM
VARICELLA IgG
VARICELLA IgM
25 OH VITAMIN D TOTAL

Autoinmunidad

ANA-8
ANA-SCREEN
ENA-6 S
SM
SS-A
SS-B
Scl-70
Cenp-B
Jo-1
ds-DNA-G
ds-DNA-M
snRNP-C
U1-70 RNP
anti-CCP
RF-G
RF-M
CALPROTECTIN
CALPROTECTIN K
CARDIOLIPIN-G
CARDIOLIPIN-M
BETA 2-GLYCOPROTEIN-G
BETA 2-GLYCOPROTEIN-M
DEAMIDATED GLIADIN-A
DEAMIDATED GLIADIN-G
GLIADIN-A

GLIADIN-G
tTG-A
tTG-G
ASCA-A
ASCA-G
GBM
MPO
PR3
TG
a-TG
a-TPO
AMA-M2
LKM-1
INSULIN
INTRINSIC FACTOR
FSH
LH
PRL
TSH
ft4
ft3
TOTAL IgE

Fijación del Complemento

BORRELIA IgG
BRUCELLA
COXACKIE VIRUS A MIX
COXACKIE VIRUS B MIX
ECHO VIRUS N MIX
ECHO VIRUS P MIX
LEPTOSPIRA MIX
LISTERIA MONOCYTOGENES
PARAINFLUENZA MIX
Q FEVER



BIODIAGNOSTICO

Av. Ing. Huergo 1437 P.B. "I" | C1107APB | CABA | Argentina | Tel./Fax: +5411 4300-9090
info@biodiagnostico.com.ar | www.biodiagnostico.com.ar